

Zuidelijke glazenmaker *Aeshna affinis*

Verspreiding en trend


Tot 1995 was de Zuidelijke glazenmaker bekend van drie waarnemingen, waarvan de laatste uit 1994 betrekking had op een mannetje gevonden bij Beneden-Leeuwen. In 1995 was er sprake van een invasie waarbij de soort verspreid over het zuidelijke deel van de Nederlandse duin- en zandgronden werd waargenomen. Sindsdien wordt de soort jaarlijks waargenomen en is de soort bekend van alle provincies. In veel gevallen gaat het om slechts enkele individuen en vermoedelijk hebben deze vaak betrekking op zwervers. Toch vindt er verspreid over Nederland waarschijnlijk ook voortplanting plaats. De beste aanwijzingen daarvan komen van Voorne waar de soort vrijwel jaarlijks wordt gezien en waar eiafzet is waargenomen en van de Doort in Midden-Limburg. In het laatstgenoemde gebied werd in 2005 het eerste larvenhuidje voor Nederland gevonden (WASSCHER, 2005).



Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).

Biotoop

Het overgrote deel van de waarnemingen komt uit de duinen of van de hoge zandgronden. De soort wordt vooral aangetroffen bij ondiepe plassen en vennen. Waarschijnlijk moet het water in de zomer redelijk warm worden, zonder dat er sprake is van geheel droogvallen.



Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.

Vliegperiode

Er zijn nu redelijk veel Nederlandse waarnemingen van de Zuidelijke glazenmaker, waardoor we nu een beter beeld hebben van de vliegtijd van deze soort. De eerste waarnemingen komen uit juni maar het overgrote deel van de waarnemingen stammen uit juli en augustus. De soort is daarmee enkele weken vroeger dan de Paardenbijter (*A. mixta*).

Foto: T. Faassen



Zuidelijke glazenmaker *Aeshna affinis*.