

Zuidelijke keizerlibel *Anax parthenope*

Verspreiding en trend

Na de vangst van een vrouwtje in 1938 was een mannetje, die van 29 juni tot 4 juli 1997 aanwezig was bij het Maarnse gat, pas de tweede Nederlandse waarneming. Sinds 1997 is de Zuidelijke keizerlibel beduidend algemener geworden en de soort is nu met uitzondering van Drenthe uit alle provincies bekend. Een groot deel van de waarnemingen heeft betrekking op zwervers vanuit het buitenland. Slechts in zes gevallen werden er twee exemplaren gezien en in alle andere gevallen ging het om een enkel beest. Slechts in zeven recente gevallen ging het om een vrouwtje en in meer dan vijftig gevallen ging het om een mannetje. De eerste zekere voortplanting werd aangetoond op 27 augustus 2006 in de uiterwaard bij Beuningen (vers vrouwtje) en op 6 september 2006 bij een grindplas bij Asselt (vers mannetje, CALLE *et al.*, 2007a). Als de zomers even warm blijven zal de soort ongetwijfeld verder toenemen en zich op meer plekken gaan voortplanten.

Biotoop


De meeste Nederlandse waarnemingen komen van grote plassen. In tegenstelling tot de Grote keizerlibel wordt de soort weinig bij vaarten of kleinere plassen gezien.

Vliegperiode

De Zuidelijke keizerlibel is een zomersoort waarvan vrijwel alle waarnemingen uit juni, juli en augustus stammen. De vroegste waarneming stamt van 19 mei 1996. Met het toenemen van de voortplanting in Nederland zullen waarschijnlijk ook het aantal mei-waarnemingen toenemen.



Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).



Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.



Zuidelijke keizerlibel, *Anax parthenope*.



Glassnijder *Brachytron pratense*.