

Tangpantserjuffer *Lestes dryas*

Verspreiding en trend

De Tangpantserjuffer komt het meest voor in het oosten van Nederland in met name Drenthe, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Aan de Noordzeekust is de soort zeer zeldzaam en pas sinds 1998 is voortplanting uit de duinen bekend. In 1998 werd de eerste Tangpantserjuffer in de duinen boven het Noordzeekanaal waargenomen (WIJCKER, 2001). Vermoedelijk betreft het hier een zwerver. In de duinen van Voorne was in die periode wel een populatie Tangpantserjuffers aanwezig. Vanaf 2001 is de soort voor het eerst in Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen) waargenomen (GEENE *et al.*, 2007). In Friesland is de soort op nieuwe plaatsen op zandgrond waargenomen, zoals bijvoorbeeld in Gaasterland. De soort kan zwerven en wordt soms op minder voor de hand liggende plaatsen waargenomen, zoals in Flevoland. Evenals de sterk gelijkende Gewone pantserjuffer (*Lestes sponsa*) komt de Tangpantserjuffer vooral voor op de zandgronden, maar niet of nauwelijks in laagveengebieden. De




Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).

Foto: K. Huskens



Tangpantserjuffer *Lestes dryas*, vrouw.



Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.

soort wordt het meest aangetroffen bij verlandende vennen met een dichte water- en oeverbegroeiing van zeggen (*Carex* sp.) en biezen (*Scirpus* sp.), omgeven door bos. Het gaat hierbij vaak om relatief voedselrijke vennen. Door de sterke gelijkenis met de Gewone pantserjuffer in combinatie met de lage dichteden wordt de soort nog wel eens over het hoofd gezien. De Tangpantserjuffer koloniseert gemakkelijk nieuwe leefplekken met voor de soort het geschikte successiestadium en stelt

weinig eisen aan de waterkwaliteit. De afgelopen jaren is de soort stabiel gebleken. De Tangpantserjuffer is op meer plaatsen in de duinen waargenomen. Zal de soort hier blijvende populaties kunnen vormen?