

Vuurjuffer *Pyrhosoma nymphula*

Verspreiding en trend


De Vuurjuffer is een goed voorbeeld van een algemene soort die de laatste jaren een behoorlijke verandering in verspreiding heeft laten zien. In de periode voor 1997 ontbrak de soort op veel plaatsen in het westen en noorden van het land. Ze heeft echter met name de duinstreek opvallend snel weten te koloniseren. Voor 1998 kwam de soort niet voor ten noorden van IJmuiden maar sindsdien heeft de Vuurjuffer zich tot Den Helder uitgebreid (MANGER, 2001). Sinds 2005 wordt de soort eveneens op Texel waargenomen en in 2007 op Vlieland; wellicht is dit het begin van de kolonisatie van de Waddeneilanden. Tot 1999 was de Vuurjuffer in Zeeland eveneens een schaarse verschijning en ook hier heeft de soort zich sindsdien sterk weten uit te breiden (GEENE ET AL, 2007). Een zelfde beeld is te zien in Zuid-Holland.



Verspreiding 1990-1997 (cirkel), 1998-2007 (stip).
Distribution 1990-1997 (circle), 1998-2007 (dot).

Vliegperiode

Net als voor de meeste andere voorjaarssoorten geldt dat de Vuurjuffer de laatste jaren een stuk vroeger is gaan vliegen. De Vuurjuffer heeft momenteel een piek in de vliegtijd die bijna drie weken vroeger ligt dan in de jaren tachtig (KETELAAR, 2003).




Vliegtijd 1998-2007.
Flight period 1998-2007.



Foto: D. Kamaker

Etende Vuurjuffer *Pyrhosoma nymphula*.



Trend 1999-2007.
Trend 1999-2007.